

## TRIAGEM PARA TUBERCULOSE

ANAMNESE DIRIGIDA	SIM	NÃO
Tosse Produtiva por > 3 semanas		
Febre Vespertina		
Sudorese Noturna		
Inapetência		
Perda de Peso (> 10% do peso ideal)		
Astenia		
História Anterior de Tratamento para TB		
História Familiar de TB		
História de Quimioprofilaxia Anterior para TB		
Contato Recente com TB		

### IMUNIDADE ESPECÍFICA CONTRA *M. tuberculosis*

<b>PPD</b>	<b>Data de Realização do teste</b> ____/____/____	<b>Resultado do Teste</b> _____mm	<b>Classificação do paciente</b> <input type="checkbox"/> Positivo (PPD ≥ 5mm) <input type="checkbox"/> Negativo (PPD < 5mm)
<b>IGRA</b>	<b>Data de Realização do teste</b> ____/____/____	<b>Valor de referência:</b> <b>Negativo</b>	<b>Resultado do teste</b> <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

### RADIOGRAFIA DO TÓRAX

<b>Data da realização do exame</b> ____/____/____	<b>Resultado do exame</b> <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Imagem suspeita ou sequela de TB <input type="checkbox"/> Compatível com sequela de TB
--	--

Se o PPD for positivo (≥ 5 mm) e/ou o RX de Tórax mostrar sinais de TB latente  
Deve ser iniciada a quimioprofilaxia com Isoniazida (300 mg/dia) por 6 meses\*

PPD	RX de Tórax	Profilaxia TB
< 5 mm	Normal	Não Indicada
< 5 mm	Sequela de TB	Iniciar Quimioprofilaxia
≥ 5 mm	Sequela de TB	Avaliação do Especialista
≥ 5 mm	Normal	Iniciar Quimioprofilaxia

**Data de início da Quimioprofilaxia** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_